

あきた北農業協同組合 栽培・防除日誌（令和5年）

指導員確認	①	②	③
	月 日	月 日	月 日

◇ 生産者情報 ◇				
作物名	支店	組合員コード	生産者氏名	圃場面積
山の芋				a

◇ 作業工程 ◇					
作業名	計画	実施日	作業名	計画	実施日
土改剤散布	4月中旬	月 日	葉面散布	7月	月 日
元肥施肥	5月上旬	月 日	葉面散布	8月	月 日
定植	5月	月 日	葉面散布	9月	月 日
追肥	6月	月 日	収穫開始	10月	月 日
葉面散布	6月	月 日			
追肥	7月	月 日			

◇ 投入資材（農薬を除く） ◇													
施肥日		コード	施肥量				施肥日		コード	施肥量			
月 日						kg	月 日						kg
月 日						kg	月 日						kg
月 日						kg	月 日						kg
月 日						kg	月 日						kg
月 日						kg	月 日						kg
月 日						kg	月 日						kg
月 日						kg	月 日						kg

◇ 資材情報 ◇					
コード	資材名	コード	資材名	コード	資材名
01	土っ恋しょ	10	真山の芋名人	19	油粕
02	ヒナイドリーム	11	CDU たまご化成 S555	20	OK-F1
03	堆肥	12	国産高度化成 444	21	ハイピーマグ液剤
04	JA バラ散布	13	NK 化成 23 号	22	ポリコープ 3 号
05	石灰窒素（防散）	14	野菜追肥専用 S 646	23	
06	苦土石灰（粒）（粉）	15	畑のカルシウム	24	
07	てんろタンカル	16	天然ぼかし（ペレット）	25	
08	BM ようりん	17	卵殻エース	26	
09	苦土重焼燐	18	菜種粕	27	

収穫開始日	月 日		対象病害虫								使用時期 (収穫前)	使用回数	◇施用記録◇						
	葉剤名 (殺菌剤) (殺虫・除草剤)	倍率 投入量	最大 散布量 (10a)	炭疽病	葉渋病	褐色腐敗病	青かび病	つる枯病	ハダニ類	アブラムシ類			コガネムシ類	ヤマノイモコガ	1回	2回	3回	4回	5回
ジマンダイセン水和	400 ~600	300ℓ	●	●								収—21日	4	/	/	/	/		
ダコニール 1000	1,000	300ℓ	●	●			●					収—30日	6	/	/	/	/	/	/
トップジンM水和	800	300ℓ	●	●								収—7日	5	/	/	/	/	/	
アミスター20フロアブル	2,000	300ℓ	●	●								収—前日	3	/	/	/			
ベルコートフロアブル	1,000	300ℓ	●	●								収—7日	4	/	/	/	/		
	200	1~10分 間浸漬				●						植付け前	1	/					
ベンレートT水和 20	100 ~200	10分間 浸漬			●	●						植付け前	1	/					
ダントツ粒剤	6~9 kg /10a	—								●		植付時	1	/					
アディオオン乳剤	2,000 ~3000	300ℓ							●		●	収—7日	5	/	/	/	/	/	
コロマイト乳剤	1,000	500ℓ							●			収—7日	2	/	/				
トレボン乳剤	1,000	300ℓ							●		●	収—14日	3	/	/	/			
コテツフロアブル	2,000	300ℓ						●			●	収—前日	2	/	/				
モスピラン水溶剤	4,000	300ℓ							●		●	収—7日	3	/	/	/			
ダニサラバフロアブル	1,000	350ℓ							●			収—前日	2	/	/				
アドマイヤー1粒剤	4kg /10a	—							●		●	植付時	1	/					
ネマトリンエース粒剤	20kg /10a	—	ネコブセンチュウ (全面土壌混和)								植付前	1	/						
ロロックス	100-200 g/10a	70-150 ℓ/10a	植付直後、生育期但し、収穫 60 日前まで (植付直後：全面土壌散布 生育期：畦間土壌散布)									2	/	/					
クレマートU粒剤	4~6kg /10a	—	植付け後萌芽前 (雑草発生前) (全面土壌散布)									1	/						
バスタ液剤	300~500 ml/10a	100~150 ℓ/10a	収穫 30 日前まで (雑草生育期、植付前又は畦間処理) (雑草茎葉散布)									3	/	/	/				
ホーネスト乳剤	75~100mℓ /10a	100~150ℓ /10a	1 年生イネ科雑草 (3~5 葉期) 但し、収穫 30 日前まで (雑草茎葉散布又は、全面散布)									1	/						
ナブ乳剤	200 mℓ /10a	150ℓ/ 10a	雑草生育期 (イネ科雑草 3~8 葉期) 但し、収穫 60 日前まで (雑草茎葉散布)									1	/						
トレファノサイド粒 2.5	4~6kg/ 10a	—	植付直後、生育初期但し、植付 30 日後まで (植付直後：全面土壌散布 生育期：畦間土壌散布)									1	/						
ゴーゴーサン乳剤	200 ~ 400 mℓ/10a	100ℓ/ 10a	植付け後、萌芽前 (雑草発生前) (全面土壌散布)									1	/						
ポルトフロアブル	200 ~ 300 mℓ/10a	100ℓ/ 10a	1 年生イネ科雑草※3 (3~8 葉期) 但し、収穫 7 日前まで (雑草茎葉散布又は、全面散布)									1	/						

※1 カンザワダニ

※2 ナガイモコガ

※3 スズメノカタビラ除く