あきた北農業協同組合　　# 栽培・防除日誌（令和７年）

指導員確認	①	②	③
	月　日	月　日	月　日

◇　生　産　者　情　報　◇

作物名	支店	組合員ｺｰﾄﾞ	生産者氏名	圃場面積
				a

◇　作　業　工　程　◇

作業名	計画	実施日	作業名	計画	実施日
土改剤散布	4月中旬	月　日	葉面散布	7月	月　日
元肥施肥	5月上旬	月　日	葉面散布	8月	月　日
定植	5月	月　日	葉面散布	9月	月　日
追肥	6月	月　日	収穫開始	10月	月　日
葉面散布	6月	月　日			
追肥	7月	月　日			

◇ 投 入 資 材 （ 農 薬 を 除 く ） ◇

施肥日	コード	施肥量	施肥日	コード	施肥量
月　日		kg	月　日		kg
月　日		kg	月　日		kg
月　日		kg	月　日		kg
月　日		kg	月　日		kg
月　日		kg	月　日		kg
月　日		kg	月　日		kg

◇　資　材　情　報　◇

コード	資材名	コード	資材名	コード	資材名
01	土っ恋しょ	10	真山の芋名人 17-5-17	19	油粕
02	ヒナイドリーム	11	CDU たまご化成 S555	20	OK－F1
03	堆肥	12	国産高度化成 444	21	ハイピーマグ液剤
04	JA バラ散布	13	NK 化成 23 号	22	ポリコープ 3 号
05	石灰窒素（防散）	14	野菜追肥専用Ｓ646	23	
06	苦土石灰（粒）（粉）	15	畑のカルシウム	24	
07	てんろタンカル	16	天然ぼかし（ペレット）	25	
08	BM ようりん	17	卵殻エース	26	
09	苦土重焼燐	18	菜種粕	27	

収穫開始日	月　日		対象病害虫									使用時期（収穫前）	使用回数	◇施用記録◇					
薬　剤　名（殺菌剤）（殺虫・除草剤）	倍率 投入量	最大 散布量 (/10a)	炭疽病	葉渋病	褐色腐敗病	青かび病	つる枯病	ハダニ類	アブラムシ類	コガネムシ類	ヤマノイモコガ			1回	2回	3回	4回	5回	6回
ベルクートフロアブル	1,000	300ℓ	●	●								収―７日	5	/ ℓ	/ ℓ	/ ℓ	/ ℓ	/ ℓ	
	200	1~10 分間浸漬				●						植付前	1 ※1	/ ℓ					
ﾍﾞﾝﾚｰﾄT水和剤 20（注）	100 ~200	10 分間浸漬			●	●						植付前	1 ※1	/ ℓ					
ネマトリンエース粒剤	20kg /10a	―	ネコブセンチュウ（全面土壌混和）									植付前	1	/ kg					
アドマイヤー1 粒剤	4kg /10a	―							●	●		植付時	1	/ Kg					
ダントツ粒剤	6~9 kg /10a	―								●		植付時	1	/ kg					
ｼﾞﾏﾝﾀﾞｲｾﾝ水和剤	400 ~600	300ℓ	●	●								収―21 日	4	/ ℓ	/ ℓ	/ ℓ	/ ℓ		
ダコニール 1000	1,000	300ℓ	●	●			●					収―30 日	6	/ ℓ	/ ℓ	/ ℓ	/ ℓ	/ ℓ	/ ℓ
トップジンM水和剤（注）	800	300ℓ	●	●								収―７日	5	/ ℓ	/ ℓ	/ ℓ	/ ℓ	/ ℓ	
アミスター20 ﾌﾛｱﾌﾞﾙ	2,000	300ℓ	●	●								収―前日	3	/ ℓ	/ ℓ	/ ℓ			
オンリーワンﾌﾛｱﾌﾞﾙ	1,000	300ℓ	●	●								収―前日	3	/ ℓ	/ ℓ	/ ℓ			
アディオン乳剤	2,000 ～3,000	300ℓ							●		●	収―７日	5	/ ℓ	/ ℓ	/ ℓ	/ ℓ	/ ℓ	
コロマイト乳剤	1,000	500ℓ						●				収―７日	2	/ ℓ	/ ℓ				
トレボン乳剤	1,000	300ℓ							●		●	収―14 日	3	/ ℓ	/ ℓ	/ ℓ			
コテツフロアブル	2,000	300ℓ						● ※2			● ※3	収―前日	2	/ ℓ	/ ℓ				
ﾓｽﾋﾟﾗﾝ顆粒水溶剤	4,000	300ℓ							●		● ※3	収―７日	3	/ ℓ	/ ℓ	/ ℓ			
ダニサラバフロアブル	1,000	350ℓ						●				収―前日	2	/ ℓ	/ ℓ				
カネマイトフロアブル	1,000 ～1,500	300ℓ						●				収―３日	1	/ ℓ					
ゴーゴーサン乳剤	200~400 mℓ/10a	100ℓ	植付後萌芽前（雑草発生前）（全面土壌散布）										1	/ ℓ					
ロロックス	100~200 g/10a	150ℓ	植付直後・生育期但し、収穫 60 日前まで（植付直後：全面土壌散布　生育期：畦間土壌散布）										2	/ ℓ	/ ℓ				
バスタ液剤	300~500 ml/10a	150ℓ	収穫 30 日前まで（雑草生育期、植付前又は畦間処理）（雑草茎葉散布）										3	/ ℓ	/ ℓ	/ ℓ			
ホーネスト乳剤	75~100m ℓ/10a	150ℓ	1 年生イネ科雑草（3~5 葉期）但し、収穫 30 日前まで（雑草茎葉散布又は、全面散布）										1	/ ℓ					
ナブ乳剤	200 mℓ /10a	150ℓ	1 年生イネ科雑草※4 雑草生育期（イネ科雑草 6～8 葉期）但し、収穫 60 日前まで（雑草茎葉散布）										1	/ ℓ					
トレファノサイド粒 2.5	4~6kg /10a	―	植付直後・生育初期但し、植付 30 日後まで（植付直後：全面土壌散布　生育期：畦間土壌散布）										1	/ kg					
ポルトフロアブル	200~300 mℓ/10a	100ℓ	1 年生イネ科雑草※4 雑草生育期（3～8 葉期）但し、収穫 7 日前まで（雑草茎葉散布又は、全面散布）										1	/ ℓ					

※1 種いもへの処理　※2 カンザワハダニ　　※3 ナガイモコガ　　※4 スズメノカタビラ除く

注意事項：ベンレート剤とトップジンM水和剤はどちらか一方しか作期では使えない。