あきた北農業協同組合
販売営農部　TEL42-8800

令和7年度　栽培・防除日誌

◇ 生産者情報 ◇			◇ 圃場情報 ◇
作物名	品種名	生産者氏名	圃場合計面積
スナップエンドウ	ニムラサラダスナップ		a

指導員確認	①	②	③
	月　日	月　日	月　日
	印	印	印

◇ 作業工程 ◇

作業名	実施日	内容	作業名	実施日	内容
播種日	月　日		収穫開始日	月　日	
定植日（直播は不要）	月　日		収穫終了日	月　日	

◇ 投入資材（追肥を含む）（農薬を除く） ◇

施肥日	コード	施肥量	施肥日	コード	施肥量	施肥日	コード	施肥量
月　日		kg	月　日		kg	月　日		kg
月　日		kg	月　日		kg	月　日		kg
月　日		kg	月　日		kg	月　日		kg
月　日		kg	月　日		kg	月　日		kg

◇ 投入資材（追肥を含む）（農薬を除く） ◇

コード	資材名	コード	資材名	コード	資材名	コード	資材名
01	堆肥（　　）	6	国産高度化成484	11	尿素複合液肥2号	16	
02	苦土石灰	7	国産高度化成444	12	硝燐安加里S646	17	
03	BMようりん	8	CDUたまご化成	13		18	
04	ようりん	9	有機入り野菜用	14		19	
05		10		15		20	

RACコード	薬剤名	倍率	最大散布量(1a)	対象病害名 うどんこ病	灰色かび病	菌核病	褐紋病	褐斑病	さび病	●…予＋治	使用時期（収穫前日数）	使用回数	◇施用記録◇ 上段 散布日 下段 散布量 1回	2回	3回	4回	記入例 6/10 30ℓ 5回
3	トリフミン水和剤	3,000～5,000	30 ℓ	●							前日	5	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0
3	ラリー水和剤	4,000～8,000	30 ℓ	●							前日	3	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0
7	アフェットフロアブル	2,000	30 ℓ		●	●			●		前日	3	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0
7	カナメフロアブル	4,000	30 ℓ		●	●			●		前日	4	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0
10・1	ゲッター水和剤	1,500	30 ℓ		●						前日	3	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0
2	ロブラール水和剤	1,500	30 ℓ		●						前日	3	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0
11	アミスター20フロアブル	2,000	30 ℓ		●	●	●				前日	3	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0
1	トップジンM水和剤	2,000	30 ℓ		●		●	●			前日	3	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0
M1	サンヨール	500	30 ℓ	予防	予防						前日	4	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0
NC	カリグリーン	うどんこ800～1,000他800	30 ℓ	●	予防				予防		前日	−	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0

RACコード	薬剤名	倍率	最大散布量(1a)	対象病害名 うどんこ病	灰色かび病	菌核病	褐紋病	褐斑病	さび病	●…予＋治	使用時期（収穫前日数）	使用回数	◇施用記録◇ 上段 散布日 下段 散布量 1回	2回	3回	4回	記入例 6/10 30ℓ 5回
BM2	ボトキラー	1,000	30 ℓ	予防	予防						発病前～発病初期	−	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0
BM2,M1	クリーンカップ	うどんこ1,000～2,000 灰かび1,000	30 ℓ	予防	予防						前日	−	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0
			ℓ										/ 0	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0
			ℓ										/ 0	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0
			ℓ										/ 0	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0
			ℓ										/ 0	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0
			ℓ										/ 0	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0
			ℓ										/ 0	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0
			ℓ										/ 0	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0
			ℓ										/ 0	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0
			ℓ										/ 0	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0
			ℓ										/ 0	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0
			ℓ										/ 0	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0
			ℓ										/ 0	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0
			ℓ										/ 0	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0
			ℓ										/ 0	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0
			ℓ										/ 0	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0
			ℓ										/ 0	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0
			ℓ										/ 0	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0

●農薬を使用する際は、必ずラベルを確認し、使用方法、希釈倍率を守って使用して下さい。
●RACコード（作用機構分類コード）。農薬感受性の低下を回避するためにも、同一コードで連用しないように注意してください。

RACコード	薬剤名	倍率	最大散布量(1a)	対象病害名 エンドウハモグリバエ	ハモグリバエ類	アザミウマ類	ヨトウムシ	ハスモンヨトウ	シロイチモジヨトウ	アブラムシ類	その他	使用時期（収穫前日数）	使用回数	◇施用記録◇ 上段 散布日 下段 散布量 1回	2回	3回	記入例 6/10 30ℓ 4回
4A	スタークル粒剤	900g/a 株元散布			○							14	1	/ g	/ g	/ g	/ g
4A	スタークル 顆粒水溶剤	2,000	30 ℓ		○					○	ウラナシジミ カメムシ類	前日	2	/ ℓ	/ ℓ	/ ℓ	/ ℓ
4A	モスピラン 顆粒水溶剤	4,000	30 ℓ			○				○	コナジラミ	前日	3	/ ℓ	/ ℓ	/ ℓ	/ ℓ
1B	エルサン乳剤	アブラムシ1,000 エンドウハモグリ 1,000～1,500 他1，000	30 ℓ	○			○	○		○		28	1	/ ℓ	/ ℓ	/ ℓ	/ ℓ
1B	マラソン乳剤	アブラ・コガネ・アザミ 2,000～3,000 ハダニ2,000～3,000 イングンテントウ2,000他 1,000	30 ℓ		○	○				○	カメムシ、ハダニ類 コガネムシ イングンテントウ	7	3	/ ℓ	/ ℓ	/ ℓ	/ ℓ
3A	アディオン乳剤	3,000	30 ℓ				○				ウラナシジミ ナモグリバエ	前日	3	/ ℓ	/ ℓ	/ ℓ	/ ℓ
15	カスケード乳剤	4,000	30 ℓ					○	○			前日	2	/ ℓ	/ ℓ		
5	ディアナSC	2,500 ～ 5,000	30 ℓ		○	○		○				前日	2	/ ℓ	/ ℓ	/ ℓ	/ ℓ
28	フェニックス 顆粒水和剤	ハスモン2,000～4,000 シロイチモジ2,000	30 ℓ					○	○			前日	2	/ ℓ	/ ℓ	/ ℓ	/ ℓ
28	プレバソン フロアブル5	2,000	30 ℓ		○			○				前日	3	/ ℓ	/ ℓ	/ ℓ	/ ℓ
UN	プレオフロアブル	ハスモンヨトウ1,000～ 2,000 他1,000	30 ℓ		○			○	○		オオタバコガ	前日	2	/ ℓ	/ ℓ	/ ℓ	/ ℓ
13	コテツフロアブル	2,000	30 ℓ					○			ハダニ類	前日	2	/ ℓ	/ ℓ	/ ℓ	/ ℓ
30	グレーシア乳剤	2,000 ～ 3,000	30 ℓ		○	○		○				前日	2	/ ℓ	/ ℓ	/ ℓ	/ ℓ
21A・39	ハチハチ フロアブル (ハチハチ乳剤は使用不可)	ナモグリバエ1,000～ 2,000 うどんこ1,000	30 ℓ								ナモグリバエ うどんこ病	前日	2	/ ℓ	/ ℓ	/ ℓ	
			ℓ											/ ℓ	/ ℓ	/ ℓ	/ ℓ
			ℓ											/ ℓ	/ ℓ	/ ℓ	/ ℓ
			ℓ											/ ℓ	/ ℓ	/ ℓ	/ ℓ
			ℓ											/ ℓ	/ ℓ	/ ℓ	/ ℓ

●農薬を使用する際は、必ずラベルを確認し、使用方法、希釈倍率を守って使用して下さい。
●RACコード（作用機構分類コード）。農薬感受性の低下を回避するためにも、同一コードで連用しないように注意してください。

FRACコード表

RAC	グループ名	耐性菌発生リスク	有効成分名	成分使用回数	農薬名	農薬名(混合剤)
1	MBC 殺菌剤	高い耐性リスク	チオファネートメチル	3回以内	トップジン	ゲッター
10	N-フェニルカーバメート類	高い耐性リスク	ジエトフェンカルブ	3回以内		ゲッター
11	QoI 殺菌剤	高い耐性リスク	アゾキシストロビン	3回以内	アミスター	
2	ジカルボキシ イミド類	中程度から高い耐性リスク	イプロジオン	3回以内	ロブラール	
7	SDHI(コハク酸 脱水素酵素阻害剤)	中程度から高い耐性リスク	ペンチオピラド	3回以内	アフェット	
			インピルフルキサム	4回以内	カナメ	
3	DMI 殺菌剤	中程度の耐性リスク	トリフルミゾール	5回以内	トリフミン	
			ミクロブタニル	3回以内	ラリー	
M1	無機化合物（求電子剤）	耐性リスクは低い	銅	4回以内	サンヨール	
				–		クリーンカップ
39	ピラゾールカルボキサミド類	耐性は知られていない	トルフェンピラド	2回以内	ハチハチ	
NC	種々	耐性は知られていない	炭酸水素カリウム	–	カリグリーン	
BM2	微生物	耐性は知られていない	バチルス ズブチリス	–	ボトキラー	
				–		クリーンカップ

IRACコード表

主要作用機構グループと一次作用部位		サブグループ		有効成分	農薬名
1	アセチルコリンエステラーゼ（AChE）阻害剤	1B	有機リン系	PAP（フェントエート）	エルサン
	神経作用			マラソン(マラチオン)	マラソン
3	ナトリウムチャネルモジュレーター	3A	ピレスロイド系	ペルメトリン	アディオン
	神経作用				
4	ニコチン性アセチルコリン受容体（nAChR)競合的モジュレーター	4A	ネオニコチノイド系	ジノテフラン	スタークル
	神経作用				アルバリン
				アセタミプリド	モスピラン
5	ニコチン性アセチルコリン受容体（nAChR)アロステリックモジュレーター 部位Ⅰ		スピノシン系	スピネトラム	ディアナ
	神経作用				
13	プロトン勾配を攪乱する酸化的リン酸化脱共役剤		ピロール系	クロルフェナピル	コテツ
	エネルギー代謝				
15	CHS1に作用するキチン生合成阻害剤		ベンゾイル尿素系	フルフェノクスロン	カスケード
	生育調節				
21	ミトコンドリア電子伝達系複合体Ⅰ 阻害剤(METI)	21A	METI剤	トルフェンピラド	ハチハチ
	エネルギー代謝				
28	リアノジン受容体モジュレーター		ジアミド系	フルベンジアミド	フェニックス
	神経および筋肉作用			クロラントラニリプロール	プレバソン
30	GABA作動性塩化物イオンチャネ ルアロステリックモジュレーター		イソオキサゾリン系	フルキサメタミド	グレーシア
	神経作用				
UN	作用機構が不明あるいは不明確な剤A		ピリダリル	ピリダリル	プレオ