

◎太枠内を記入してください◎

JA あきた北

栽培・防除日誌 (2023 年)

指導員 確認	①	②	③
	月 日	月 日	月 日

◇ 生産者情報 ◇				
作物名	品種名	支店	生産者氏名	圃場面積
アスパラ	パイトル			a

◇ 作業工程 ◇					
作業名	計画	実施日	作業名	計画	実施日
株焼き	4月上旬	月 日	追肥	7月中旬	月 日
春肥	4月上旬～4月中旬	月 日	追肥	8月中旬	月 日
基肥	5月下旬～6月上旬	月 日	茎葉刈取	11月中旬	月 日
誘引	6月下旬～7月上旬	月 日			月 日

◇ 投入資材 (農薬を除く) ◇							
施肥日	コード	施肥量		施肥日	コード	施肥量	
月 日			kg	月 日			kg
月 日			kg	月 日			kg
月 日			kg	月 日			kg
月 日			kg	月 日			kg
月 日			kg	月 日			kg
月 日			kg	月 日			kg

◇ 資材情報 ◇					
コード	資材名	コード	資材名	コード	資材名
01	堆肥	09	ようりん (粒) 国産	17	野菜追肥専用 S646
02	土っ恋しよ	10	畑のカルシウム	18	てんろタンカル
03	ヒナイドリーム	11	アヅミン	19	石灰窒素 (粒)
04	ペレット鶏糞	12	FTE	20	石灰窒素 (防散)
05	レオグリーン特号	13	国産高度化成 444	21	
06	苦土石灰 (粉)	14	MMB 有機 020 (アスパラ専用)	22	
07	苦土石灰 (粒)	15	CDU たまご化成 S555	23	
08	ようりん (砂) 国産	16	パワフルアスパラ 520	24	

収穫開始日 : 月 日		※アスパラに使用できる農薬の一部を掲載しています。							
薬剤名 【葉面散布剤】	希釈倍率	使用目的	使用回数	◇ 施用記録 ◇					
				月日 散布量	記入例 6/10 200ℓ				
				1回	2回	3回	4回	5回	6回
バイカルティ	1000倍	トロケ予防、日持ち、汚れ軽減 ※コサイドと混用すると良い	-	/	/	/	/	/	/
トップスコアリン	1000~2000倍	病気抵抗性、免疫力向上、 光合成増進、根張り	-	/	/	/	/	/	/
アミノメリット青	500倍	天候不良時の生育促進	-	/	/	/	/	/	/
ソイルサプリエキス	500~1000倍	天候不良時の生育促進 品質向上	-	/	/	/	/	/	/
リンクエース	500~1000倍	株養成・養分転流促進	-	/	/	/	/	/	/
ハイピーマグ	500~1000倍	株養成・養分転流促進	-	/	/	/	/	/	/
メリット赤	300倍	養分転流促進	-	/	/	/	/	/	/

◆散布量は混用する農薬散布量に準ずる。アルカリ性薬剤との混用はしない！！

		※アスパラに使用できる農薬の一部を掲載しています。								
薬剤名 【除草剤】 ※収穫期は畝間処理	使用薬量 (10a)	希釈水量 (10a)	使用方法	使用時期	使用回数	◇ 施用記録 ◇				
						月日 散布量	記入例 6/10 200ℓ			
						1回	2回	3回	4回	5回
バスタ液剤	300~500 ml	100~150ℓ	雑草茎葉散布	前日	合計	/	/			
ザクサ液剤	300~500 ml	100~150ℓ	雑草茎葉散布	前日	2	/	/			
ナブ乳剤(イネ科雑草)	150~200 ml	100~150ℓ	雑草茎葉散布 又は全面散布	前日	1	/				
ブリグロックス L	600~1000ml	100~150ℓ	雑草茎葉散布	前日	3	/	/	/		
センコル水和剤	100~150g	100ℓ	雑草茎葉散布 全面土壌散布	萌芽前 萌芽始期	1	/				
ロロックス	150~200g	70~150ℓ	全面土壌散布	萌芽前 萌芽始期	1	/				
ロロックス	150~200g	100ℓ	雑草茎葉兼土 壌散布(畦間・ 株間処理)	前日	1	/				
ラウンドアップ マックスロード	200~500 ml	50~100ℓ	雑草茎葉散布	前日 (耕起前)	2 (1)	/	/			

※アスパラに使用できる農薬の一部を掲載しています。

薬剤名 【殺菌剤】	希釈倍率	最大散布量 (10a)	対象病害							使用時期 (収穫前)	使用回数	◇ 施用記録 ◇					
			茎枯病	斑点病	褐斑病	立枯病	軟腐病	株腐病	疫病			月日 散布量	記入例 6/10 200ℓ				
													1回	2回	3回	4回	5回
コサイド 3000	2,000	300ℓ	●	●	●						—	—	/	/	/	/	/
ダコニール 1000	1,000	400ℓ	●	●	●					●	前日	合計 4	/	/	/	/	
ベジセイバー	1,000	300ℓ	●	●	●						前日	合計 4	/	/	/	/	
アフエットフロアブル	2,000	300ℓ	●	●	●						前日	4	/	/	/	/	
アミスター 20 フロアブル	2,000	300ℓ	●	●	●						前日	4	/	/	/	/	
ストロビーフロアブル	2,000	500ℓ		●							前日	3	/	/	/		
スターナ水和剤	2,000	500ℓ					●				前日	2	/	/			
トリフミン水和剤 (灌注)	1,000	1㎡当り3ℓ				●					7日前	1	/				
ベルクート水和剤	1,000	500ℓ	●	●	●						7日前	合計 5	/	/	/	/	/
ベフラン液剤 25	1,000	300ℓ	●								収穫 終了後	5	/	/	/	/	/
ラリー水和剤	4,000	300ℓ		●	●						前日	2	/	/			
ロブラール水和剤	2,000	300ℓ	●	●	●						前日	5	/	/	/	/	/
ファンタジスタ 顆粒水和剤	3,000	300ℓ	●	●	●						前日	3	/	/	/		
シグナム WDG	1,500	500ℓ	●	●	●						前日	2	/	/			

※アスパラに使用できる農薬の一部を掲載しています。

薬剤名 【殺虫剤】	希釈倍率	最大散布量 (10a)	対象害虫										使用時期 (収穫前)	使用回数	◇ 施用記録 ◇					
			クビナガハムシ	ヨトウムシ	ハスモンヨトウ	オオタバコガ	カメムシ類	アブラムシ類	ネギアザミウマ	コナジラミ類	カタツムリ類	月日 散布量			記入例 6/10 200ℓ					
															1回	2回	3回	4回	5回	
アディオオン乳剤	2,000 ～ 3,000	300ℓ	●	●			●	●						前日	3	/	/	/		
ノーモルト乳剤	2,000	300ℓ			●									前日	2	/	/			
カスケード乳剤	4,000	500ℓ			●	●			●					前日	2	/	/			
アーデント水和剤	1,000	500ℓ				●	●	●						前日	2	/	/			
アフアーム乳剤	2,000	300ℓ		●	●	●								前日	2	/	/			
ダントツ水溶剤	2,000 ～ 4,000	300ℓ	●				●	●	●					前日	3	/	/	/		
モスピラン顆粒 水溶剤	4,000	300ℓ	●				●	●	●	●				前日	2	/	/			
コテツフロアブル	2,000	500ℓ	●	●	●	●								前日	2	/	/			
ハチハチフロアブル	1,000	800ℓ	●					●	●	●				前日	2	/	/			
コルト顆粒水和剤	4,000	700ℓ					●	●	●					前日	3	/	/	/		
スタークル顆粒水溶剤	2,000	800ℓ	●				●	●	●					前日	3	/	/	/		
スラゴ粒剤	1㎡ 5g	5kg										●	発生時	—	/	/	/	/	/	
グレーシア乳剤	2,000	500ℓ	●	●					●					前日	2	/	/			
ディアナ SC	2,500 ～ 5,000	500ℓ							●					前日	2	/	/			