栽　培・防　除　日　誌

栽培日誌

指導員確認	①	②	③
	月　日	月　日	月　日

生産者情報			圃場情報					
作物名	品種名	生産者氏名	圃場①(　　)	圃場②(　　)	圃場③(　　)	圃場④(　　)	圃場⑤(　　)	合計
小玉スイカ	あきた夏丸チッチェ		a	a	a	a	a	a

作業工程	圃場No.	定植No.	定植	整枝	1回目つる引き	2回目つる引き	交配	収穫
		1	本　月　日	月　日 ～ 月　日	月　日 ～ 月　日	月　日 ～ 月　日	月　日 ～ 月　日	月　日 ～ 月　日
		2	本　月　日	月　日 ～ 月　日	月　日 ～ 月　日	月　日 ～ 月　日	月　日 ～ 月　日	月　日 ～ 月　日
		3	本　月　日	月　日 ～ 月　日	月　日 ～ 月　日	月　日 ～ 月　日	月　日 ～ 月　日	月　日 ～ 月　日
		4	本　月　日	月　日 ～ 月　日	月　日 ～ 月　日	月　日 ～ 月　日	月　日 ～ 月　日	月　日 ～ 月　日
		5	本　月　日	月　日 ～ 月　日	月　日 ～ 月　日	月　日 ～ 月　日	月　日 ～ 月　日	月　日 ～ 月　日
		6	本　月　日	月　日 ～ 月　日	月　日 ～ 月　日	月　日 ～ 月　日	月　日 ～ 月　日	月　日 ～ 月　日
		7	本　月　日	月　日 ～ 月　日	月　日 ～ 月　日	月　日 ～ 月　日	月　日 ～ 月　日	月　日 ～ 月　日
		8	本　月　日	月　日 ～ 月　日	月　日 ～ 月　日	月　日 ～ 月　日	月　日 ～ 月　日	月　日 ～ 月　日

元肥 施肥日	資材	投入量	(圃場No.)	施肥日	資材	投入量	(圃場No.)	施肥日	資材	投入量	(圃場No.)
/				/				/			
/				/				/			
/				/				/			

追肥 施肥日	資材	投入量	(定植No.)	施肥日	資材	投入量	(定植No.)
/				/			
/				/			
/				/			

資材情報 コード	資材名	容量	窒素	リン酸	カリ	アルカリ分	苦土	カルシウム	マンガン	ホウ素	鉄	亜鉛	銅	モリブデン	腐植酸	有機物	アミノ酸	ケイ酸	糖類
1	レオグリーン特号	20kg	3.36	3.31	1.35		0.52		290ppm	31ppm	0.79			6.6ppm				2.4	
2	アヅミン	20kg					4								50				
3	天然フルボ	20kg	1.26	0.17	0.05											79.34			
4	粒状苦土石灰	20kg				55	15		40ppm	30ppm	600ppm	45ppm	1ppm	1ppm		1.95			
5	粒状てんろタンカル	20kg				46	2		2	100ppm	16							7.9	
6	ストロングバランス	20kg				35	12		0.2	0.2	0.1	0.07	0.04						
7	畑のカルシウム	20kg						28.5											
8	BMようりん	20kg		20		45	13		1	0.5								20	
9	硫マグ25	20kg					25		1ppm	0.08	0.03	2ppm	1ppm						
10	硫酸カリ	20kg			50														
11	ま果せな菜	20kg	8	12	6		2			0.4									
12	フレッシュフルーツ王国	20kg	15	5	3		1		0.15	0.4									
13	有機アグレット666	20kg	6	6	6		1												
14	メリット青	液肥	7	5	3				0.1	0.2	0.08	0.05	0.05	0.075					
15	メリット黄	液肥	3	7	6				0.1	0.2	0.08	0.05	0.05	0.075					
16	ベルキング500	液肥	漢方生薬、核酸、アミノ酸、低級有機酸、ミネラル類					植物のもつ病害防御機能の強化と活着・発根促進。光合成を活発にして樹勢強化。											
17	PSダッシュMEネオ	液肥	微量要素入り亜リン酸カリ肥料					作物の代謝を即効的に改善する。根張り・分枝・花芽分化の促進、徒長防止・食味の改善など。											
18	PSカル	液肥	カルシウム剤					細胞が強化され果肉・茎葉がしまり、店持ち・品質を改善。葉先枯れ、尻腐れ等の予防。											
19	ソイルサプリエキス	液肥	大麦発酵濃縮液100%の高濃度アミノ酸・有機酸					根張り、生育向上、品質向上が期待でき、成り疲れ解消にも役立つ。土壌中の有効微生物の増殖を促進し、地力を高める。											

1ppm＝0.0001%

防除日誌(殺菌剤)

RAC	薬剤名	倍率	使用方法	炭疽病	つる枯病	菌核病	べと病	疫病	褐色腐敗病	褐斑細菌病	うどんこ病	使用時期	使用回数	散布日	定植No.	散布日	定植No.	散布日	定植No.	散布日	定植No.	散布日	定植No.	散布日	定植No.	散布日	定植No.	散布日	定植No.	散布日	定植No.
4 M5	フォリオゴールド	つる枯、炭疽800 褐色腐敗800～1,000	散布	○	○				○			収-7日	3	/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ	
1	トップジンM水和剤	1,500～2,000	散布	○		○						収-前日	5	/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ	
7 M5	ベジセイバー	1000	散布	○	○	○					○	収-3日	3	/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ	
11	アミスター20フロアブル	2,000	散布	○	○							収-前日	4	/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ	
11	スクレアフロアブル	2,000	散布	○	○	○						収-前日	3	/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ	
11 M7	ファンベル顆粒水和剤	1,000	散布	○	○	○					○	収-前日	4	/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ	
24 M1	カスミンボルドー	1,000	散布							○	○	収-前日	5	/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ	
12	セイビアーフロアブル20	1,000	散布	○		○						収-前日	3	/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ	
3 M3	テーク水和剤	600～800	散布	○	○						○	収-7日	5	/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ	
19 M7	ポリベリン水和剤	うどんこ1,000～2,000 炭疽、つる枯、ﾊﾀﾞﾆ1,000	散布	○	○				ハダニ類		○	収-前日	4	/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ	
40 M5	プロポーズ顆粒水和剤	1000	散布	○					○			収-3日	5	/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ	
M1 M4	オキシラン水和剤	つる枯500 炭疽500～600	散布	○	○							収-14日	5	/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ	
UN M3	ジマンダイセン水和剤	400～600	散布	○	○		○	○		○		収-7日	7	/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ	
M4	オーソサイド水和剤80	800	潅注	苗立枯病			は種後から2～3葉期まで						5	/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ	
M4	オーソサイド水和剤80	炭疽400～800 つる枯、べと600	散布	○	○		○					収-14日	5	/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ	
M5	ダコニール1000	炭疽700つる枯700～1,000	散布	○	○							収-3日	5	/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ	
M7	ベルクート水和剤	1,000	散布	○	○	○					○	収-前日	4	/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ	
														/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ	

RAC	薬　剤　名	倍　率	使用方法	炭疽病	つる枯病	菌核病	べと病	疫病	褐色腐敗病	褐斑細菌病	うどんこ病	使用時期	使用回数	散布日	定植No.	散布日	定植No.	散布日	定植No.	散布日	定植No.	散布日	定植No.	散布日	定植No.	散布日	定植No.	散布日	定植No.	散布日	定植No.
														/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ	
														/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ	
														/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ	
														/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ	

FRACコード表

RAC	グループ名	耐性菌発生リスク	有効成分名	成分使用回数	チェック用							農薬名	農薬名(混合剤)
4	PA殺菌剤	高/複数の耐性菌が発生。	メタラキシルM	3回以内									フォリオゴールド、リドミルゴールドMZ
1	MBC殺菌剤	高/広範囲の耐性菌が発生。											
			チオファネートメチル	5回以内								トップジンM	ゲッター
10	N-フェニルカーバメート	高/耐性菌発生。	ジエトフェンカルブ	5回以内									ゲッター
7	SDHI殺菌剤	中～高/複数の耐性菌が発生。	ペンチオピラド	3回以内								アフェット	ベジセイバー
			ボスカリド	3回以内								カンタス	
			ピラジフルミド	3回以内								パレード	パレード20フロアブル
11	QoI殺菌剤	高/複数の耐性菌が発生。	アゾキシストロビン	4回以内								アミスター	アミスターオプティ
			マンデストロビン	3回以内								スクレア	
			ピリベンカルブ	4回以内									ファンベル
24	ヘキソピラノシル抗生物質	中/耐性糸状菌、細菌が発生。	カスガマイシン	5回以内									カスミンボルドー、カッパーシン
12	PP殺菌剤	低～中	フルジオキソニル	3回以内								セイビアー	
3	DMI殺菌剤	中/複数の病原菌において耐性が発生している。	シメコナゾール	5回以内									テーク
			ジフェノコナゾール	3回以内								スコア	
19	ポリオキシン	中	ポリオキシン	5回以内								ポリオキシン	ポリベリン
40	CAA殺菌剤	低～中	ベンチアバリカルブイソプロピル	5回以内									プロポーズ
			マンジプロパミド	2回以内								レーバス	
M1	無機化合物	全体的に低リスクとみなしている。	銅	ー								Zボルドー	カスミンボルドー、カッパーシン、オキシラン
M3	ジチオカーバメート		マンゼブ	7回以内								ジマンダイセン	リドミルゴールドMZ、テーク
M4	フタルイミド		キャプタン	5回以内								オーソサイド	オキシラン
M5	クロロニトリル		TPN	5回以内								ダコニール	フォリオゴールド、ベジセイバー、アミスターオプティ、プロポーズ
M7	ビスグアニジン		イミノクタジンアルベシル酸塩	4回以内								ベルクート	ファンベル
			イミノクタジン酢酸塩	4回以内									ポリベリン

防除日誌(殺虫剤)

RAC	薬剤名	倍率	使用方法	オオタバコガ	ヨトウムシ	ハスモンヨトウ	ミナミキイロアザミウマ	アザミウマ類	コナジラミ類	アブラムシ類	ウリハムシ	ウリノメイガ	ハダニ類	使用時期	使用回数	散布日	定植No.	散布日	定植No.	散布日	定植No.	散布日	定植No.	散布日	定植No.	散布日	定植No.	散布日	定植No.	散布日	定植No.
1B	スミチオン乳剤	ｱﾌﾞﾗﾑｼ類1,000～2,000 ｱｻﾞﾐｳﾏ類700～1,000	散布					○		○				収-3日	6	/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ	
1B	マラソン乳剤	ｱﾌﾞﾗﾑｼ類1,000～3,000 ﾊﾀﾞﾆ類1,000～3,000 ｳﾘﾊﾑｼ1,000	散布							○	○		○	収-前日	6	/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ	
3A	アーデント水和剤	1,000	散布							○			○	収-前日	5	/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ	
3A	トレボン乳剤	1,000	散布		○	○			○	○				収-3日	3	/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ	
4A	モスピラン顆粒水溶剤	ｺﾅｼﾞﾗﾐ類、ｳﾘﾉﾒｲｶﾞ2,000 ｱﾌﾞﾗﾑｼ類、ｱｻﾞﾐｳﾏ類2,000～4,000 ｳﾘﾊﾑｼ4,000	散布					○	○	○	○	○		収-3日	3	/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ	
4A	アドマイヤー1粒剤	ｱﾌﾞﾗﾑｼ類1～5g/株 ｱｻﾞﾐｳﾏ類1～2g/株	植穴土壌混和					○		○				定植時	1	/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ	
4C	トランスフォームフロアブル	ｱﾌﾞﾗﾑｼ類2,000 ｺﾅｼﾞﾗﾐ類1,000～2,000	散布						○	○				収-前日	3	/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ	
5	ディアナSC	ｺﾅｼﾞﾗﾐ類2,500 他2,500～5,000	散布	○		○		○	○			○		収-前日	2	/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ	
6	アニキ乳剤	1,000	散布	○										収-前日	3	/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ	
9B	チェス顆粒水和剤	5,000	散布							○				収-3日	4	/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ	
11A	エスマルクDF	1,000	散布	○	○									発生初期 収-前日	ー	/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ	
13	コテツフロアブル	ﾐｶﾝｷｲﾛｱｻﾞﾐｳﾏ4,000 他2,000	散布	○			○					○	○	収-前日	2	/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ	
15	カスケード乳剤	ｼﾛｲﾁﾓｼﾞﾖﾄｳ4,000 他2,000～4,000	散布	○			○			マメハモグリバエ シロイチモジヨトウ				収-7日	4	/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ	
28	フェニックス顆粒水和剤	2,000～4,000	散布	○		○						○		収-前日	2	/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ	
28	ヨーバルフロアブル	ｺﾅｼﾞﾗﾐ類、ｱｻﾞﾐｳﾏ類2,500 他2,500～5,000	散布	○		○		○	○	○		○	ハモグリバエ	収-前日	2	/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ	
29	ウララDF	2,000～4,000	散布							○				収-前日	2	/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ	
30	グレーシア乳剤	2,000	散布	○		○		○	○		ハモグリバエ	○	○	収-前日	2	/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ		/ ℓ	

防除日誌(殺虫剤)

RAC	薬剤名	倍率	使用方法	オオタバコガ	ヨトウムシ	ハスモンヨトウ	ミナミキイロアザミウマ	アザミウマ類	コナジラミ類	アブラムシ類	ウリハムシ	ウリノメイガ	ハダニ類	使用時期	使用回数	散布日	定植No.	散布日	定植No.	散布日	定植No.	散布日	定植No.	散布日	定植No.	散布日	定植No.	散布日	定植No.
																／		／		／		／		／		／		／	
																ℓ		ℓ		ℓ		ℓ		ℓ		ℓ		ℓ	
																／		／		／		／		／		／		／	
																ℓ		ℓ		ℓ		ℓ		ℓ		ℓ		ℓ	
																／		／		／		／		／		／		／	
																ℓ		ℓ		ℓ		ℓ		ℓ		ℓ		ℓ	
																／		／		／		／		／		／		／	
																ℓ		ℓ		ℓ		ℓ		ℓ		ℓ		ℓ	
																／		／		／		／		／		／		／	
																ℓ		ℓ		ℓ		ℓ		ℓ		ℓ		ℓ	

防除日誌(ダニ剤)

RAC	薬剤名	倍率	使用方法	殺卵力	殺幼虫力	殺成虫力	残効性		ミツバチへの影響	天敵への影響		使用時期	使用回数	散布日	定植No.	散布日	定植No.	散布日	定植No.	散布日	定植No.	散布日	定植No.	散布日	定植No.	散布日	定植No.
6	コロマイト乳剤	1,000	散布	◎	◎	◎	△		1日	大		収-7日	2	／		／		／		／		／		／		／	
														ℓ		ℓ		ℓ		ℓ		ℓ		ℓ		ℓ	
10B	バロックフロアブル	2,000	散布	○	○	×	○		1日	ー		収-前日	2	／		／		／		／		／		／		／	
														ℓ		ℓ		ℓ		ℓ		ℓ		ℓ		ℓ	
20B	カネマイトフロアブル	1,000～1,500	散布	◎	◎	◎	○		1日	ー		収-前日	1	／		／		／		／		／		／		／	
														ℓ		ℓ		ℓ		ℓ		ℓ		ℓ		ℓ	
21A	ダニトロンフロアブル	1,000～2,000	散布	△	○	○	○		1日	大		収-前日	1	／		／		／		／		／		／		／	
														ℓ		ℓ		ℓ		ℓ		ℓ		ℓ		ℓ	
21A	サンマイトフロアブル	1,000～1,500	散布	○	○	○	○		3日	大		収-3日	2	／		／		／		／		／		／		／	
														ℓ		ℓ		ℓ		ℓ		ℓ		ℓ		ℓ	
21A	ピラニカEW	2,000～3,000	散布	○	○	○	○		1日	大		収-3日	1	／		／		／		／		／		／		／	
														ℓ		ℓ		ℓ		ℓ		ℓ		ℓ		ℓ	
23	モベントフロアブル	2,000	散布	◎	◎	×	◎		1日	大		収-前日	3	／		／		／		／		／		／		／	
														ℓ		ℓ		ℓ		ℓ		ℓ		ℓ		ℓ	
25A	スターマイトフロアブル	2,000	散布	○	○	○	○		1日	ー		収-前日	1	／		／		／		／		／		／		／	
														ℓ		ℓ		ℓ		ℓ		ℓ		ℓ		ℓ	
25A	ダニサラバフロアブル	1,000	散布	○	○	○	○		1日	ー		収-前日	2	／		／		／		／		／		／		／	
														ℓ		ℓ		ℓ		ℓ		ℓ		ℓ		ℓ	
25B	ダニコングフロアブル	3,000	散布	○	◎	◎	◎		1日	ー		収-前日	1	／		／		／		／		／		／		／	
														ℓ		ℓ		ℓ		ℓ		ℓ		ℓ		ℓ	

IRACコード表

主要作用機構グループと一次作用部位	サブグループ	有効成分	農薬名
1　アセチルコリンエステラーゼ（AChE）阻害剤 神経作用	**1B**　有機リン系	MEP（フェニトロチオン）	スミチオン
		マラソン(マラチオン)	マラソン
3　ナトリウムチャネルモジュレーター 神経作用	**3A**　ピレスロイド系 ピレトリン系	アクリナトリン	アーデント
		シペルメトリン	アグロスリン
		エトフェンプロックス	トレボン
		ペルメトリン	アディオン
4　ニコチン性アセチルコリン受容体(nAChR)競合的モジュレーター 神経作用	**4A**　ネオニコチノイド系	アセタミプリド	モスピラン
		クロチアニジン	ダントツ
		ジノテフラン	スタークル
		イミダクロプリド	アドマイヤー
		ニテンピラム	ベストガード
		チアメトキサム	アクタラ
	4C　スルホキシイミン系	スルホキサフロル	トランスフォーム
5　ニコチン性アセチルコリン受容体(nAChR)アロステリックモジュレーター – 部位I 神経作用	**5**　スピノシン系	スピネトラム	ディアナ
6　グルタミン酸作動性塩化物イオン(塩素イオン)チャネル(GluCl) アロステリックモジュレーター 神経および筋肉作用	**6**　アベルメクチン系 ミルベマイシン系	エマメクチン安息香酸塩	アファーム
		レピメクチン	アニキ
		ミルベメクチン	コロマイト
9　弦音器官TRPVチャネルモジュレーター 神経作用	**9B**　ピリジン アゾメチン誘導体	ピメトロジン	チェス
		ピリフルキナゾン	コルト
11　微生物由来昆虫中腸内膜破壊剤	**11A**　Bacillus thuringiensis と殺虫タンパク質生産物	B.t. subsp.aizawai	ゼンターリ、ジャックポット
		B.t. subsp.kurstaki	エスマルク、デルフィン
13　プロトン勾配を撹乱する酸化的リン酸化脱共役剤 エネルギー代謝	**13**　ピロール ジニトロフェノール スルフルラミド	クロルフェナピル	コテツ
15　CHS1に作用するキチン生合成阻害剤 成長調節	**15**　ベンゾイル尿素系	フルフェノクスロン	カスケード
		ルフェヌロン	マッチ
		テフルベンズロン	ノーモルト
28　リアノジン受容体モジュレーター 神経および筋肉作用	**28**　ジアミド系	クロラントラニリプロール	プレバゾン
		シアントラニリプロール	ベネビア
		フルベンジアミド	フェニックス
		テトラニリプロール	ヨーバル
29　弦音器官モジュレーター 標的部位未決定 神経作用	**29**　フロニカミド	フロニカミド	ウララ
30　GABA作動性塩化物イオン(塩素イオン)チャネルアロステリックモジュレーター 神経作用	**30**　メタジアミド系 イソオキサゾリン系	フルキサメタミド	グレーシア

防除案1

散布時期	薬剤名		希釈倍率	対象病害虫	散布量(ℓ/10a)	RACｺｰﾄﾞ	使用回数	成分使用回数		成分使用回数	
定植時	殺虫	アドマイヤー1粒剤	5g/株	アブラムシ類、(アザミウマ類は1g～2g/株)		4A	1 / 1	イミダクロプリド	1 / 4		/
定植後	殺菌	オーソサイド水和剤80	600倍	炭疽病、つる枯病	100	M4	1 / 5	キャプタン	1 / 5		/
摘芯後	殺菌	ジマンダイセン水和剤	600倍	炭疽病、つる枯病、褐斑細菌病	150	M3	1 / 7	マンゼブ	1 / 7		/
整枝後	殺菌	ダコニール1000	700倍	炭疽病、つる枯病	200	M5	1 / 5	TPN	1 / 5		/
	殺虫	モスピラン顆粒水溶剤	2000倍	アブラムシ類、アザミウマ類　他		4A	1 / 3	アセタミプリド	1 / 4		/
1回目つる引き	殺菌	ジマンダイセン水和剤	600倍	炭疽病、つる枯病、褐斑細菌病	250	M3	2 / 7	マンゼブ	2 / 7		/
	殺虫	アーデント水和剤	1000倍	アブラムシ類、ハダニ類		3A	1 / 5	アクリナトリン	1 / 5		/
2回目つる引き	殺菌	ベルクート水和剤	1000倍	炭疽病、つる枯病、菌核病、うどんこ病	300	M7	1 / 4	イミノクタジンアルベシル酸塩	1 / 4		/
	殺虫	マラソン乳剤	2000倍	アブラムシ類、ハダニ類		1B	1 / 6	マラソン(マラチオン)	1 / 6		/
(発生時)	ダニ	カネマイトフロアブル	1500倍	ハダニ類	300	20B	1 / 1	アセキノシル	1 / 1		/
交配前	殺菌	プロポーズ顆粒水和剤	1000倍	炭疽病、褐色腐敗病	300	40・M5	1 / 5	ベンチアバリカルブイソプロピル	1 / 5	TPN	2 / 5
	殺虫	ディアナSC	5000倍	ｵｵﾀﾊﾞｺｶﾞ、ﾊｽﾓﾝﾖﾄｳ、ｳﾘﾉﾒｲｶﾞ		5	1 / 2	スピネトラム	1 / 2		/
交配後①	殺菌	テーク水和剤	600倍	炭疽病、つる枯病	300	3・M3	1 / 5	シメコナゾール	1 / 5	マンゼブ	3 / 7
	殺虫	フェニックス顆粒水和剤	2000倍	ｵｵﾀﾊﾞｺｶﾞ、ﾊｽﾓﾝﾖﾄｳ、ｳﾘﾉﾒｲｶﾞ		28	1 / 2	フルベンジアミド	1 / 2		/
交配後②	殺菌	フォリオゴールド	800倍	炭疽病、つる枯病、褐色腐敗病	300	4・M5	1 / 3	メタラキシルM	1 / 3	TPN	3 / 5
	殺虫	ディアナSC	5000倍	ｵｵﾀﾊﾞｺｶﾞ、ﾊｽﾓﾝﾖﾄｳ、ｳﾘﾉﾒｲｶﾞ		5	2 / 2	スピネトラム	1 / 2		/
(発生時)	ダニ	コロマイト乳剤	2000倍	ハダニ類	300	6	1 / 2	ミルベメクチン	1 / 2		/
交配後③	殺菌	アミスター20フロアブル	2000倍	炭疽病、つる枯病	300	11	1 / 4	アゾキシストロビン	1 / 4		/
	殺虫	グレーシア乳剤	2000倍	ｵｵﾀﾊﾞｺｶﾞ、ﾊｽﾓﾝﾖﾄｳ、ｳﾘﾉﾒｲｶﾞ　他		30	1 / 2	フルキサメタミド	1 / 2		/

防除案2

散布時期	薬剤名		希釈倍率	対象病害虫	散布量(ℓ/10a)	RACｺｰﾄﾞ	使用回数	成分使用回数		成分使用回数	
定植時	殺虫	アドマイヤー1粒剤	5g/株	アブラムシ類、(アザミウマ類は1g～2g/株)		4A	1 / 1	イミダクロプリド	1 / 4		/
定植後	殺菌	オーソサイド水和剤80	600倍	炭疽病、つる枯病	100	M4	1 / 5	キャプタン	1 / 5		/
整枝後	殺菌	ダコニール1000	700倍	炭疽病、つる枯病	200	M5	1 / 5	TPN	1 / 5		/
1回目つる引き	殺菌	ジマンダイセン水和剤	600倍	炭疽病、つる枯病、褐斑細菌病	250	M3	1 / 7	マンゼブ	1 / 7		/
	殺虫	モスピラン顆粒水溶剤	2000倍	アブラムシ類、アザミウマ類　他		4A	1 / 3	アセタミプリド	1 / 4		/
2回目つる引き	殺菌	ジマンダイセン水和剤	600倍	炭疽病、つる枯病、褐斑細菌病	300	M3	2 / 7	マンゼブ	2 / 7		/
	殺虫	ディアナSC	5000倍	ｵｵﾀﾊﾞｺｶﾞ、ﾊｽﾓﾝﾖﾄｳ、ｳﾘﾉﾒｲｶﾞ		5	1 / 2	スピネトラム	1 / 2		/
交配後①	殺菌	アミスター20フロアブル	2000倍	炭疽病、つる枯病	300	11	1 / 4	アゾキシストロビン	1 / 4		/
	殺虫	フェニックス顆粒水和剤	2000倍	ｵｵﾀﾊﾞｺｶﾞ、ﾊｽﾓﾝﾖﾄｳ、ｳﾘﾉﾒｲｶﾞ		28	1 / 2	フルベンジアミド	1 / 2		/
交配後②	殺菌	ポリベリン水和剤	1000倍	炭疽病、つる枯病、ハダニ	300	19・M7	1 / 5	ポリオキシン複合体	1 / 5	イミノクタジン酢酸塩	1 / 4
	殺虫	ディアナSC	5000倍	ｵｵﾀﾊﾞｺｶﾞ、ﾊｽﾓﾝﾖﾄｳ、ｳﾘﾉﾒｲｶﾞ		5	2 / 2	スピネトラム	1 / 2		/
交配後③	殺菌	テーク水和剤	600倍	炭疽病、つる枯病	300	3・M3	1 / 5	シメコナゾール	1 / 5	マンゼブ	3 / 7
	殺虫	グレーシア乳剤	2000倍	ｵｵﾀﾊﾞｺｶﾞ、ﾊｽﾓﾝﾖﾄｳ、ｳﾘﾉﾒｲｶﾞ　他		30	1 / 2	フルキサメタミド	1 / 2		/

スイカ炭疽病



スイカ褐色腐敗病

スイカつる枯病