令和５年大豆防除栽培日誌

◇　生　産　者　情　報　◇					◇　種　子　更　新　状　況　◇		◇作付面積合計◇
作物名	品種名	支店名	生産者氏名	電話番号	購入種子　　ｋｇ	自家採取種子　　ｋｇ	a
大豆	リュウホウ						

◇　作　業　工　程　◇	
実施日	作　業　名
月　日	耕　起
月　日	播　種
月　日	中耕・培土
月　日	〃
月　日	〃
月　日	
月　日	収　穫
月　日	乾　燥
月　日	調　整
月　日	

◇　肥　料　情　報　◇						
施肥日	投入資材（農薬を除	施肥量				
月　日	ようりん（砂）					ｋｇ
月　日	ようりん（粒）					ｋｇ
月　日	苦土石灰（粉）					ｋｇ
月　日	苦土石灰（粒）					ｋｇ
月　日	乾燥けいふん					ｋｇ
月　日	ペレット鶏糞					ｋｇ
月　日	おまかせ大豆Ｖ２BB					ｋｇ
月　日	国産高度化成４４４					ｋｇ
月　日						
月　日						
月　日						

◇　農　薬　情　報　◇					◇　施　用　記　録　◇									
用途	薬　剤　名	使用基準（10ａ当たり）			希釈倍率又は使用量	散布量		1	2	3	4	5	6	7	8
		希釈倍率又は使用量	使用時期	回数											
殺虫・殺菌	クルーザーＭＡＸＸ	8ml／種子１kg	播種前	1			ml								
殺虫剤	クルーザーＦＳ３０	6ml／種子１kg	播種前	1			ml								
除草剤	クリアターン細粒剤Ｆ	4～5kg	播種直後～雑草発生前(5日以内)乳剤・水和剤は70ﾘｯﾄﾙ～150ﾘｯﾄﾙの水にとかす	1			kg								
〃	トレファノサイド粒剤	4～5kg		1			kg								
〃	ロロクッス水和剤	150ｇ		1			ﾘｯﾄﾙ								
〃	エコトップ乳剤	500～600ml		1			ﾘｯﾄﾙ								
〃	ラッソー乳剤	400ml		1			ﾘｯﾄﾙ								
〃	ナブ乳剤	150～200ml	ノビエ３～５葉期	1			ﾘｯﾄﾙ								
〃	ポルトフロアブル	200～300ml	ノビエ３～８葉期	1			ﾘｯﾄﾙ								
殺菌剤	トライフロアブル	1000倍	収－14日前	2			ﾘｯﾄﾙ								
〃	プランダム乳剤25	3000～5000倍	収－7日前	2			ﾘｯﾄﾙ								
殺虫剤	アグロスリン乳剤	2000倍	収－7日前	3			ﾘｯﾄﾙ								
〃	ダイアジノン粒剤５	4～6kg	収－30日前	5			kg								
〃	トレボン乳剤	1000倍	収－14日前	計2回			ﾘｯﾄﾙ								
〃	トレボンＥＷ	1000倍	収－14日前				ﾘｯﾄﾙ								
〃	トレボン粉剤	4kg	収－14日前				ﾘｯﾄﾙ								
〃	アディオン乳剤	3000倍	収－７日前	3			ﾘｯﾄﾙ								
〃	スミチオン乳剤	1000～2000倍	収－21日前	4			ﾘｯﾄﾙ								
〃	パーマチオン水和剤	1000～2000倍	収－21日前	3			ﾘｯﾄﾙ								
〃	プレバソンフロアブル	4000倍	収－7日前	2			ﾘｯﾄﾙ								
鳥　害	キヒゲンセット	種子重量の１％粉衣	播種前	1											